

WowZen LEISHWow



FAVORECE LAS DEFENSAS Y AYUDA A POTENCIAR EL SISTEMA INMUNITARIO FRENTE A PARÁSITOS DE LOS PERROS

Los problemas asociados a la presencia de parásitos en nuestras mascotas son múltiples, pudiendo afectar a cualquier órgano, tejido e incluso líquidos corporales. Pueden aparecer signos que afectan al aparato digestivo, a la piel o al sistema inmune. Estos signos van a conllevar la pérdida de peso y la disminución en la calidad de vida de nuestros animales.

El método convencional para atajar este problema va asociado en un gran número de ocasiones a la aparición de efectos no deseados, recaídas o molestias de distintos tipos que hace necesaria la búsqueda de alternativas.

- 10 KG CONTENIDO POR COMPRIMIDO:**
Ext. seco Artemisa
(*Artemisa annua* L. planta entera).....250 mg
- 20 KG CONTENIDO POR COMPRIMIDO:**
Ext. seco Artemisa
(*Artemisa annua* L. planta entera).....500 mg
- 30 KG CONTENIDO POR COMPRIMIDO:**
Ext. seco Artemisa
(*Artemisa annua* L. planta entera).....750 mg

FORMATO:

LEISHWow PERROS 10 kg: 60 comprimidos de 350 mg.
LEISHWow PERROS 20 kg: 60 comprimidos de 700 mg.
LEISHWow PERROS 30 kg: 60 comprimidos de 1050 mg.

MODO DE EMPLEO:

LEISHWow PERROS 10 kg: 1 comprimido por cada 10 kg de peso, cada 12 horas, en ayunas y en semanas alternas.
LEISHWow PERROS 20 kg: 1 comprimido por cada 20 kg de peso, cada 12 horas, en ayunas y en semanas alternas.
LEISHWow PERROS 30 kg: 1 comprimido por cada 30 kg de peso, cada 12 horas, en ayunas y en semanas alternas.

La toma inicial puede aumentarse sin llegar a superar 5 cápsulas por toma en cada una de las referencias y para el peso indicado. Ej: Perro de 10 kg que toma 1 cápsula cada 12 horas en ayunas y en semanas alternas, puede tomar la cápsula para un animal de 30kg (esto supondría aumentar su toma 3 veces), con la misma pauta, pudiendo llegar incluso a administrar hasta 5 veces su toma inicial.

RECOMENDADO EN:

Animales que necesiten reforzar su respuesta inmune en procesos parasitarios que la comprometan.

EFFECTOS NO DESEADOS:

No descritos a las tomas recomendadas.

NO RECOMENDADO:

En hembras en el primer tercio de la gestación ya que la administración de artemisinina puede afectar negativamente. (Boareto et al, 2008).

